

YUVIWEL puede ayudar a marcar la diferencia

Descubra el primer y único tratamiento de una sola dosis semanal aprobado por la FDA para su uso en niños con acondroplasia.

Brynlyn, 11 años

Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 7 años

En un estudio de 1 año, los niños con acondroplasia de entre 2 y 12 años que recibieron YUVIWEL crecieron más rápidamente que aquellos que recibieron placebo.

USO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es YUVIWEL?

YUVIWEL es un medicamento recetado que se usa para aumentar el crecimiento lineal en niños de 2 años o más con acondroplasia y con placas de crecimiento (epífisis) abiertas.

YUVIWEL se ha aprobado mediante un procedimiento de aprobación acelerada basado en una mejora de la velocidad de crecimiento anualizada. La continuidad de la aprobación puede estar supeditada a la verificación y descripción del beneficio clínico en ensayos de confirmación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUVIWEL?

YUVIWEL puede causar efectos secundarios graves, incluido el riesgo de presión arterial baja.

Si su hijo/a presenta una disminución de la presión arterial o síntomas de presión arterial baja (mareos, sensación de cansancio o náuseas) mientras recibe tratamiento con YUVIWEL, llame al proveedor de atención médica de su hijo/a.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.

“ Hay cosas de la vida que parecen pequeñas, pero que en realidad son grandes. Puede alcanzar la leche, lavarse el cabello y andar en bicicleta sin ningún tipo de adaptación. El crecimiento la ha ayudado. ”

- Brandi, mamá de Brynlyn

Brynlyn, 11 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 7 años

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUVIWEL? (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de YUVIWEL incluyen reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picazón, decoloración de la piel, sangrado, hinchazón, moretones, dolor y ampollas).

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la [Ficha Técnica completa](#) y la [Información para el Paciente de YUVIWEL](#).



navepegritide[®]
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

Cómo actúa YUVIWEL

La acondroplasia es una afección genética poco frecuente que afecta el crecimiento y desarrollo óseo. Es consecuencia de un cambio en el gen denominado FGFR3.


El **crecimiento óseo habitual** sucede cuando dos factores están en equilibrio:

El **FGFR3**, una proteína natural, ayuda a enlentecer el crecimiento óseo.
La **CNP**, una hormona que se produce naturalmente, ayuda a fomentar el crecimiento óseo.




En la acondroplasia, **el FGFR3 se encuentra hiperactivo y frena el crecimiento óseo en gran medida.**

Como consecuencia, la CNP no puede ayudar a que los huesos de todo el cuerpo crezcan como deberían.



YUVIWEL funciona con la CNP natural del organismo para fomentar el crecimiento óseo.

La CNP en YUVIWEL ayuda a contrarrestar el FGFR3 hiperactivo que causa la acondroplasia.



Porter, 4 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 2 años

“Creíamos que YUVIWEL sería la mejor oportunidad para nosotros porque consistía en una inyección de una vez por semana.”

- Lauren, mamá de Porter

YUVIWEL proporciona un nivel estable de CNP (el ingrediente activo que fomenta el crecimiento) durante la semana.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de administrarle YUVIWEL a su hijo/a, informe al proveedor de atención médica sobre todas las afecciones médicas que padezca, incluidas las siguientes:

- tiene problemas renales
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si YUVIWEL puede dañar al feto
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si YUVIWEL pasa a la leche materna

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.

yuviwel
navepegritide
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

YUVIWEL puede formar parte de un plan de tratamiento diseñado para ayudar a su hijo/a a crecer

Su hijo/a puede recibir YUVIWEL en una dosis semanal a partir de los 2 años hasta que se cierren sus placas de crecimiento



Las placas de crecimiento son las partes de los huesos de un niño que logran el crecimiento.

- Placas de crecimiento “abiertas” significa que aún es posible el crecimiento
- Placas de crecimiento “cerradas” significa que no es posible el crecimiento. Esto sucede al final de la pubertad

YUVIWEL funciona en el tiempo limitado en que las placas de crecimiento están abiertas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Informe al proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma su hijo/a, incluidos los medicamentos con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de YUVIWEL. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. **Se le recomienda informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. También puede informar los efectos secundarios a Ascendis Pharma al 1-844-442-7236.**

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.

Porter, 4 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 2 años.

Otros no son pacientes reales.



Obtenga más información acerca de YUVIWEL y cómo el tratamiento puede beneficiar a su hijo/a.

yuviwel
navepegritide
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

La diferencia de YUVIWEL

En un estudio de un año realizado en niños con acondroplasia, en promedio:

- Los niños que recibieron YUVIWEL crecieron con más rapidez que los que recibieron placebo (una inyección sin medicina), independientemente de la edad
 - El grupo que recibió YUVIWEL creció 0.6 pulgadas (1.5 centímetros) más por año que aquel que recibió placebo
 - Los niños menores de 5 años crecieron 0.4 pulgadas más por año mientras que los niños de 5 años o más crecieron 0.7 pulgadas más por año
-
- En un estudio continuo, los niños a los que se los trató con YUVIWEL durante 2 años mantuvieron su nivel de crecimiento más rápido a lo largo de la experiencia de tratamiento



Colton, 8 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 2 años

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Qué es YUVIWEL?

YUVIWEL es un medicamento recetado que se usa para aumentar el crecimiento lineal en niños de 2 años o más con acondroplasia y con placas de crecimiento (epífisis) abiertas. YUVIWEL se ha aprobado mediante un procedimiento de aprobación acelerada basado en una mejora de la velocidad de crecimiento anualizada. La continuidad de la aprobación puede estar supeditada a la verificación y descripción del beneficio clínico en ensayos de confirmación.

Crecimiento por año con YUVIWEL frente a placebo



El estudio de YUVIWEL se realizó con 84 niños de 2 a 12 años. El estudio midió cuántas pulgadas creció un niño en un año (al final de las 52 semanas). Esta medida se denomina **velocidad de crecimiento anualizada (AGV)**.

YUVIWEL está aprobado en función de las mejoras en la AGV durante más de un año.

Se han implementado estudios continuos para evaluar la eficacia y seguridad de YUVIWEL durante un período mayor. Además, hay un monitoreo continuo de criterios de valoración adicionales del estudio relacionados con el arqueamiento de las piernas, proporcionalidad corporal y funcionamiento físico.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.



YUVIWEL tiene un perfil de seguridad establecido



Los efectos secundarios más frecuentes fueron vómitos, reacciones en el lugar de la inyección, dolor en los brazos y las piernas, y náuseas. Las reacciones en el lugar de la inyección incluyeron enrojecimiento, picazón, decoloración de la piel, sangrado, hinchazón, moretones, dolor y ampollas.



El 3 % de los niños tratados con YUVIWEL experimentó un aumento del crecimiento del vello cerca del lugar de la inyección o en las extremidades, la espalda y los hombros, en comparación con el 0 % de los niños que recibieron placebo. Alternar el lugar de la inyección con cada dosis puede reducir este riesgo.



- En el estudio de YUVIWEL, nadie suspendió el tratamiento debido a los efectos secundarios
- Todas las reacciones en el lugar de la inyección fueron leves. En promedio, los niños presentaron menos de una reacción en el lugar de la inyección cada 2 años de tratamiento con YUVIWEL



Colton, 8 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 2 años

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.


navepegritide
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

La administración de YUVIWEL en una dosis semanal es ideal para una agenda ocupada



YUVIWEL se administra mediante una inyección semanal. Se puede aplicar en cualquier hora del día que se adapte mejor a su rutina familiar. No hay necesidad de planificar en torno a comidas, snacks u horarios para dormir.



Una vez por semana significa **313 días sin recibir inyección al año.**



Si bien es mejor que se administre YUVIWEL el mismo día cada semana, a veces suceden distintos acontecimientos y los planes cambian. **De ese modo, es bueno saber que el día de dosificación se puede ajustar a 2 días antes o 2 días después de la dosificación planificada en caso de ser necesario.** Retome la dosificación semanal con la siguiente dosis en el día habitual de administración.

Dosis olvidadas:

- Si han pasado más de 2 días desde la fecha de dosificación prevista, omita la dosis olvidada y administre YUVIWEL el siguiente día programado
- Debe haber como mínimo 5 días entre dosis

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUVIWEL?

YUVIWEL puede causar efectos secundarios graves, incluido el riesgo de presión arterial baja. Si su hijo/a presenta una disminución de la presión arterial o síntomas de presión arterial baja (mareos, sensación de cansancio o náuseas) mientras recibe tratamiento con YUVIWEL, llame al proveedor de atención médica de su hijo/a.



Brynlyn, 11 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 7 años

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.



Cambio sin perder ningún día de tratamiento: Su hijo/a puede comenzar a recibir YUVIWEL una vez por semana después de su última dosis de su tratamiento con CNP.



Es fácil almacenar YUVIWEL. YUVIWEL sin mezclar se puede almacenar en el refrigerador o a temperatura ambiente.



Ascendis le brinda apoyo con capacitación sobre aplicación de inyecciones en el hogar sin costo alguno, para que pueda aprender a administrar YUVIWEL a su hijo/a de forma segura y correcta.



La dosis de una vez por semana reduce el espacio, el almacenamiento y los insumos necesarios para las inyecciones. Cada caja de YUVIWEL contiene 4 kits pequeños con todo lo que necesita para 4 inyecciones semanales.



Vea el video Instrucciones de uso antes de administrar YUVIWEL.

yuviwel
navepegritide
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

Apoyo personalizado en cada paso

El programa Ascendis Signature Access Program (A•S•A•P) proporciona servicios de asistencia continua a lo largo de la experiencia de tratamiento.*



* A•S•A•P ofrece servicios de apoyo a pacientes elegibles a quienes se les ha recetado YUWIWEL para su indicación aprobada.

A través de A•S•A•P, un Enlace de Acceso para Pacientes (PAL) puede responder preguntas y proporcionar apoyo a lo largo del camino:



Le ayuda a comprender su cobertura de seguro, los beneficios y las opciones de apoyo financiero



Proporciona apoyo para aprender a aplicar inyecciones



Brinda información acerca de la acondroplasia y cómo YUWIWEL puede ajustarse al plan de tratamiento de su hijo/a

Apoyo financiero

Los pacientes elegibles con seguro médico comercial pueden pagar un mínimo de \$0 por mes por YUWIWEL†

Si no tiene seguro o su seguro es insuficiente, puede calificar para recibir tratamiento sin costo alguno a través del Programa de Asistencia para Pacientes de Ascendis (PAP)‡

†Elegibilidad: Los beneficiarios de atención médica estatal y federal no son elegibles (los participantes de los programas, como Medicaid, Medicare, Medigap, VA, DOD o TRICARE). La oferta no es válida para pacientes que pagan en efectivo. Se aplican términos y condiciones. Para consultar los términos y condiciones completos y los criterios de elegibilidad, visite yuviwel.com/pdf/copay-terms.pdf.

‡Para consultar los términos y condiciones completos, visite yuviwel.com/pdf/pap-terms.pdf.



Conéctese con un PAL ahora.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUWIWEL.



Recursos útiles para niños con acondroplasia y su familia

Los grupos de defensa como estos pueden ayudar a las familias a acceder a recursos y a sentirse parte de una comunidad.



Growing Stronger

Mejora de la calidad de la atención médica para quienes viven con enanismo mediante el apoyo a la investigación.



LITTLE PEOPLE of AMERICA
Empowerment • Awareness • Community

Fundada en 1957, Little People of America (LPA) es la organización más grande y de mayor trayectoria que brinda apoyo a personas que padecen enanismo. Mediante una red nacional de distritos, LPA proporciona apoyo, educación y defensa que reflejan y celebran las identidades y experiencias vividas de las personas con baja estatura.



Dedicada a fortalecer y apoyar a las personas con displasia esquelética y a su familia.



the chandler project

ADVOCACY • AWARENESS • RESEARCH • SUPPORT

Generación de conciencia de la investigación transformadora sobre acondroplasia y otras displasias esqueléticas mediante apoyo a una comunidad y red global de pacientes, padres y cuidadores que buscan información.

Se proporcionan los grupos de defensa a fines informativos.



Encuentre un médico cerca de su domicilio con experiencia en acondroplasia.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.



for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

“

Espero que los padres sepan que cuentan con opciones y que no tienen por qué temer. Nuestros hijos/as pueden ser y hacer lo que deseen siempre que cuenten con apoyo.

- Amber, mamá de Colton

”



Acceda a información de parte de cuidadores como usted a medida que comparten sus experiencias con una dosis semanal de YUVIWEL.

Colton, 8 años
Recibe tratamiento con YUVIWEL como parte de un ensayo clínico desde los 2 años

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUVIWEL? (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de YUVIWEL incluyen reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picazón, decoloración de la piel, sangrado, hinchazón, moretones, dolor y ampollas).

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.


yuviwel
navepegritide
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg

Conozca el tratamiento con

YUVIWEL de una sola dosis semanal



El primer y único tratamiento de una sola dosis semanal aprobado por la FDA diseñado para ayudar a crecer a niños con acondroplasia



Una vez por semana significa 313 días sin recibir inyección al año



Se puede aplicar en cualquier hora del día que se adapte mejor a su rutina familiar



Perfil de seguridad establecido

Porter, 4 años
Recibe
tratamiento con
YUVIWEL como
parte de un
ensayo clínico
desde los 2 años



**Conéctese con un
Enlace de Acceso para
Pacientes ahora.**

USO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es YUVIWEL?

YUVIWEL es un medicamento recetado que se usa para aumentar el crecimiento lineal en niños de 2 años o más con acondroplasia y con placas de crecimiento (epífisis) abiertas.

YUVIWEL se ha aprobado mediante un procedimiento de aprobación acelerada basado en una mejora de la velocidad de crecimiento anualizada. La continuidad de la aprobación puede estar supeditada a la verificación y descripción del beneficio clínico en ensayos de confirmación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUVIWEL?

YUVIWEL puede causar efectos secundarios graves, incluido el riesgo de presión arterial baja. Si su hijo/a presenta una disminución de la presión arterial o síntomas de presión arterial baja (mareos, sensación de cansancio o náuseas) mientras recibe tratamiento con YUVIWEL, llame al proveedor de atención médica de su hijo/a.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este documento, así como la Ficha Técnica completa y la Información para el Paciente de YUVIWEL.



© Septiembre de 2026 Ascendis Pharma Endocrinology, Inc. Todos los derechos reservados. YUVIWEL®, Ascendis Signature Access Program®, Ascendis®, el logotipo de Ascendis Pharma y el logotipo de la compañía son marcas comerciales registradas propiedad de Ascendis Pharma Group. US-COMMCNP-2600247 09/26



yuviwel
navepegritide
for injection 1.3 • 2.8 • 5.5 mg