

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
YUUIWEL® (YOU-vih-well)
(navepegritide)
Solamente para uso subcutáneo

¿Qué es YUUIWEL?

YUUIWEL es un medicamento recetado que se usa para aumentar el crecimiento lineal en niños de 2 años o más con acondroplasia y con placas de crecimiento (epífisis) abiertas.

Antes de administrarle YUUIWEL a su hijo/a, informe al proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si su hijo/a:

- tiene problemas renales.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si YUUIWEL puede dañar al feto.
- está amamantando o tiene previsto hacerlo. Se desconoce si YUUIWEL se traslada a la leche materna. Consulte con el proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar al bebé de su hija, si su hija recibe YUUIWEL.

Informe al proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma su hijo/a, incluidos medicamentos recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.

Conozca los medicamentos que toma su hijo/a. Lleve una lista de estos para mostrársela al proveedor de atención médica y al farmacéutico de su hijo/a cuando le den un medicamento nuevo.

¿Cómo debo administrar YUUIWEL?

Lea las instrucciones de uso detalladas que se incluyen con el medicamento YUUIWEL de su hijo/a para obtener información sobre cómo guardar, preparar y administrar YUUIWEL, y también cómo desecharlo (tirarlo) de forma adecuada.

- Administre YUUIWEL exactamente como lo indicó el proveedor de atención médica de su hijo/a.
- Si YUUIWEL se ha conservado en el refrigerador, deje el vial y la jeringa precargada con diluyente durante aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente antes del uso.
- YUUIWEL se administra mediante una inyección bajo la piel (subcutánea). YUUIWEL puede inyectarse en la zona abdominal (a unas 2 pulgadas del ombligo) o en los muslos. Si es un cuidador quien administra la inyección de YUUIWEL, se pueden utilizar los glúteos o la parte posterior del brazo como lugares de inyección. Elija un lugar de inyección diferente cada vez. Evite inyectar en áreas donde la piel esté enrojecida, inflamada o con cicatrices.
- El proveedor de atención médica de su hijo/a le enseñará cómo preparar e inyectar YUUIWEL de manera correcta antes de que lo utilice por primera vez en casa.
- Inyecte YUUIWEL una vez a la semana en el día programado de administración. Puede elegir cualquier momento del día para administrar la inyección a su hijo/a.
- Si su hijo/a se salta una dosis de YUUIWEL, administre la dosis olvidada lo antes posible, pero no más de 2 días después del día de administración en que se saltó la dosis. Para evitar que se salte alguna dosis, YUUIWEL se puede administrar hasta dos días antes o dos días después del día previsto para la dosis. Si pasaron más de dos días, su hijo/a debe omitir la dosis olvidada, y la siguiente dosis se debe administrar en el día programado habitualmente. En ambos casos, su hijo/a puede volver al cronograma habitual de administración de una vez por semana. Deben transcurrir al menos cinco días entre dosis.
- En caso de que no esté seguro de cuándo inyectar YUUIWEL, llame al proveedor de atención médica de su hijo/a o al farmacéutico. No administre YUUIWEL con mayor frecuencia de la indicada por el proveedor de atención médica.
- La dosis de YUUIWEL depende del peso corporal de su hijo/a. El proveedor de atención médica le indicará qué concentración de YUUIWEL debe utilizar y qué cantidad debe administrarle a su hijo/a.
- Su proveedor de atención médica controlará el crecimiento de su hijo/a y le indicará cuándo debe detener el uso de YUUIWEL si determina que su hijo/a ya no puede crecer. Suspenda la administración de YUUIWEL a su hijo/a si se lo indica el proveedor de atención médica de su hijo/a.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUWIWEL?

YUWIWEL puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes:

- **riesgo de presión arterial baja.** Si su hijo/a presenta una disminución de la presión arterial o síntomas de presión arterial baja (mareos, sensación de cansancio o náuseas) durante el tratamiento con YUWIWEL, llame al proveedor de atención médica que lo atiende.

Los efectos secundarios más frecuentes de YUWIWEL incluyen los siguientes:

Reacciones en el lugar de la inyección, como enrojecimiento, pruritos, pigmentación de la piel, hemorragia, hinchazón, hematomas, dolor y pequeñas ampollas llenas de líquido que se forman en el lugar de la inyección.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de YUWIWEL. Para obtener más información, consulte al proveedor de atención médica de su hijo/a o a su farmacéutico.

Llame al proveedor de atención médica para obtener recomendación médica sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar YUWIWEL?

- Guarde YUWIWEL en el refrigerador a una temperatura entre 36 °F y 46 °F (2 °C y 8 °C) en la caja original para protegerlo de la luz.
- No congele YUWIWEL.
- YUWIWEL también se puede guardar a temperatura ambiente, hasta 86 °F (30 °C), durante un máximo de 6 meses, y se puede volver a guardar en el refrigerador dentro de ese plazo de 6 meses. No use YUWIWEL después de la fecha de caducidad ni 6 meses después de la fecha en que se retiró del refrigerador por primera vez (lo que ocurra primero).
- **Una vez mezclado**, YUWIWEL se puede guardar a temperatura ambiente hasta 86 °F (30 °C) y se debe utilizar dentro de un plazo de 4 horas. Deseche el medicamento no utilizado. Deseche el medicamento si no se utiliza dentro de un plazo de 4 horas tras su mezcla.

Mantenga YUWIWEL y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de YUWIWEL.

En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos a los indicados en el prospecto. No use YUWIWEL para tratar una afección distinta de la que se le haya recetado. No suministre YUWIWEL a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que su hijo/a. Podría ser perjudicial para ellas. Puede pedirle a un farmacéutico o a un proveedor de atención médica información sobre YUWIWEL destinada a proveedores de atención médica.

¿Cuáles son los ingredientes de YUWIWEL?

Ingredientes activos: navepegritide

Ingredientes inactivos: ácido succínico, trehalosa dihidratada, trometamina y ácido clorhídrico. El diluyente contiene agua estéril para inyección, USP.

Fabricado por:
Ascendis Pharma Growth Disorders A/S
Tuborg Boulevard 12,
DK-2900 Hellerup, Dinamarca

Si desea obtener más información ingrese en www.YUWIWEL.com o llame a Ascendis Signature Access Program® (A-S-A-P) al 1-844-442-7236. Ascendis Pharma Endocrinology Inc., Princeton, New Jersey 08540, EE. UU.

© 2026 Ascendis Pharma. Todos los derechos reservados. YUWIWEL®, Ascendis®, TransCon®, el logotipo de Ascendis Pharma y el logotipo de la compañía son marcas comerciales registradas propiedad de Ascendis Pharma Group.